

# Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L) dari Daerah Sleman dengan Metode DPPH

by Andriani Disa

---

**Submission date:** 04-Jun-2023 11:14AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2108608253

**File name:** ktivitas\_Antioksidan\_Ekstrak\_Etanol\_70\_Bunga\_Telang\_Clitoria.pdf (620.55K)

**Word count:** 2987

**Character count:** 18270

1

## Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Bunga Telang (*Clitoria ternatea L.*) dari Daerah Sleman dengan Metode DPPH

### Antioxidant Activity Test of 70% Ethanol Extract of Telang Flower (*Clitoria ternatea L.*) from Sleman Area with DPPH Method

Disa Andriani\*, Lusia Murtisiwi

Departement of Natural Pharmaceutical Technology and Drug Synthesis , Pharmacy Undergraduate Study Program, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, Solo-Baki Kwarasan Street, Grogol, Sukoharjo, Central Java, 57552, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email: [disa.andriani@yahoo@gmail.com](mailto:disa.andriani@yahoo@gmail.com)

Received: 20 November 2019; Accepted: 23 Juni 2020; Published: 30 Juni 2020

#### 31 Abs trak

Bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) mengandung senyawa fenolik yang dapat berperan sebagai antioksidan dengan mendonorkan hidrogen sehingga menstabilkan kekurangan elektron pada radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi antioksidan ekstrak etanol bunga telang dengan melihat nilai IC<sub>50</sub>. Bunga telang diekstraksi dengan metode macerasi menggunakan pelarut etanol 70%. Potensi antioksidan ditetapkan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) dengan pembanding vitamin C yang sudah terbukti memiliki potensi radikal bebas yang sangat poten. Hasil penelitian menunjukkan nilai IC<sub>50</sub> ekstrak etanol bunga telang adalah  $41,36 \pm 1,191 \mu\text{g/mL}$ , berdasarkan nilai tersebut ekstrak bunga telang dari daerah Sleman termasuk kategori sangat poten sehingga dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber antioksidan dari bahan alam.

**Kata kunci :** Ekstrak bunga telang , antioksidan,DPPH, IC<sub>50</sub>

#### Abstract

*Telang flower (*Clitoria ternatea L.*) contains phenolic compounds which can act as antioxidants by donating hydrogen so as to stabilize the lack of electrons in free radicals. This study aims to determine the antioxidant potential of telang flower ethanol extract by looking at the IC<sub>50</sub> value. Telang flowers were extracted by maceration method using 70% ethanol solvent. The potential for antioxidants was determined by the DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) method with a comparison of vitamin C which had been shown to have the potential of free radicals which were very potent. The results showed the IC<sub>50</sub> value of telang flower ethanol extract was  $41,36 \pm 1,191 \mu\text{g}/\text{mL}$ , based on that value the telang flower extract from the Sleman area was in the very potent category so that it could be developed as a source of antioxidants from natural ingredients.*

**Keywords:** telang flower extract, antioxidant, DPPH, IC<sub>50</sub>

#### PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah besar bukti telah berkembang mendukung peran kunci dari radikal bebas dalam banyak reaksi seluler. Radikal bebas dapat mengoksidasi asam nukleat, protein, lipid sehingga menginisiasi terjadinya degenerasi dan kerusakan sel. Tubuh dapat terpapar radikal bebas melalui faktor lingkungan seperti polusi, intensitas sinar UV yang berlebih, suhu, bahan kimia, dan kekurangan gizi. Jika jumlah radikal bebas berlebih, maka dapat terjadi ketidakseimbangan antara molekul radikal bebas dengan antioksidan

endogen. Saat jumlah radikal bebas melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya, maka terbentuk stres oksidatif. Stres oksidatif yang berlangsung lama dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sel dan jaringan. Kerusakan sel dan jaringan ini dapat memicu munculnya penyakit-penyakit degenaratif (Susantiningih, 2015). Berbagai penyakit degenaratif tersebut adalah kardiovaskular, kerusakan retina, katarak, hepatitis, artritis reumatoid, stroke, asma, diabetes melitus, imunodepresi, kanker, hiperoksia, dermatitis, penuaan dini (Phaniendra and Jestadi, 2015)

Antioksidan merupakan setiap zat yang apabila dalam konsentrasi rendah dibandingkan substrat yang teroksidasi dapat secara signifikan menunda atau menghambat oksidasi substrat tersebut. Mekanisme antioksidan digolongkan menjadi 2 yaitu Elektron Transfer (ET) dan Hidrogen Elektron Transfer (HET). Elektron Transfer (ET) berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi dengan mengukur kapasitas antioksidan yang ditandai terjadinya perubahan warna, sedangkan Hidrogen Elektron Transfer (HET) digunakan untuk mengukur kemampuan antioksidan dalam menghambat radikal bebas dengan donor atom hidrogen (Apak, et al., 2013). Peran fisiologis antioksidan adalah untuk mencegah kerusakan komponen seluler yang timbul sebagai konsekuensi dari reaksi kimia yang melibatkan radikal bebas (Werdhasari, 2014).<sup>37</sup>

Bunga Telang tidak hanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias tetapi juga sebagai obat tradisional (Purba, 2020). Bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) diketahui mengandung flavonoid, antosianin, flavonol glikosida, kaempferol glikosida, querisetin glikosida, mirisetin glikosida (Kazuma, et al., 2013), 3-O-(2"-O-alfarhamnosil-6"-O-malonyl)-beta-glukosida, 3-O-(6"-O-alfa-rhamnosil-6"-O-malonil)-beta-glukosida dan 3-O-(2",6"-di-O-alfarhamnosil)-beta-glukosida kaemferol, querisetin dan mirisetin diisolasi dari kelopak bunga. Delfinidin glikosida, 3-O-b-glukosida, 3-O(2"-O-a-rhamnosil)-b-glukosida, 3-O-(2"-O-a-rhamnosil-6"-O-malonil)-b-glukosida delfinidin, dan delapan antosianin (ternatin C1, C2, C3, C4, C5 dan D3, serta preternatin A3 dan C4) juga diisolasi dari bunga telang (Kogawa, et al., 2006; Terahara, et al., 1998). Selain itu bunga telang juga mengandung terpenoid, tannin dan steroid (Gupta, 2010). Menurut Duta and Ray (2014), senyawa fenolik berkorelasi positif dengan aktivitas antioksidan, sehingga polifenol kemungkinan merupakan senyawa yang memberikan potensi aktivitas antiradikal dari bunga telang. Berdasarkan hasil penelitian Andriani dan Murtisiwi (2018) terdahulu,

dideapatkan kadar fenolik total ekstrak etanol bunga telang sebesar  $19,43 \pm 1,621$  GAE (mg/g sampel). Penelitian Anisa (2019) menunjukkan uji aktivitas antioksidan ekstrak bunga telang dari daerah Bogor dengan menggunakan pelarut etanol 96% tidak poten sebagai antioksidan. Berdasarkan penelitian Sholekah (2017) menunjukkan bahwa kandungan fitokimia hasil dari metabolit sekunder seperti flavonoid dan beta karoten dari suatu tanaman akan berbeda pada setiap wilayah dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, pH, ketinggian tempat, dan temperatur.

Sekian itu, konsentrasi etanol berpengaruh terhadap rendemen, total fenol, total flavonoid dan aktivitas penghambat radikal DPPH dengan kandungan tertinggi terdapat pada ekstrak etanol 70% (Suhendra, et al., 2019). Hal ini mendasari perlu dilakukannya uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) dengan pelarut etanol 70% dan berasal dari sumber lain dengan ketinggian berbeda yaitu dari Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan bunga telang dari daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber antioksidan alami.

## METODE PENELITIAN

### Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat-alat gelas yang lazim digunakan di laboratorium; mikropipet; spektrofotometer UV-Vis (UV Mini SHIMADZU).

### Bahan

<sup>29</sup> Bunga telang yang diperoleh dari Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; DPPH (Sigma, ChemCo, ); etanol *p.a.*(E.Merck); dan vitamin C (Sigma Co.).

### Ekstraksi

Bunga telang (*Clitoria ternatea L.*) yang telah dikeringkan sampai kadar airnya kurang dari 10 %, dibuat serbuk yang melewati

ayakan mesh -20 + 30. Ekstraksi simplisia dilakukan dengan metode maserasi berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia (Departemen Kesehatan RI, 2008) yang dimodifikasi. Merasasi simplisia bunga telang yang dilakukan berdasarkan Andriani dan Murtisiwi (2018).

#### **Uji aktivitas antioksidan (metode DPPH)**

Aktivitas antiradikal dalam ekstrak etanol bunga telang ditentukan dengan metode DPPH sesuai yang dilakukan Widhihastuti (2011).

#### **Pembuatan larutan pereaksi DPPH**

Sebanyak 15,77 mg DPPH ditimbang seksama kemudian dilarutkan dengan etanol *p.a* sampai tepat 100,0 mL, sehingga diperoleh konsentrasi 0,4 mM. Larutan DPPH ini disimpan dalam wadah yang dilapisi aluminium foil di almari es.

#### **Penentuan panjang gelombang maksimum ( $\lambda_{maks}$ )**

Sebanyak 0,7 mL DPPH ditempatkan dalam labu takar 5,0 mL, ditambah etanol *p.a* sampai tanda, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 450-545 nm terhadap blangko 5,0 mL etanol *p.a*, diplotkan harga absorbansi maksimum.

#### **Pembuatan larutan stok ekstrak etanol bunga telang**

Sampel ekstrak etanol bunga telang ditimbang 10,00 mg, ditambah pelarut etanol *p.a*, divorteks sampai homogen, dimasukkan dalam labu takar 10,0 mL, sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi 0,1 %.

#### **Pembuatan larutan stok vitamin C**

Vitamin C ditimbang 10,00 mg, ditambah pelarut, divorteks sampai homogen, dimasukkan ke dalam labu takar 10,0 mL, ditambah pelarut sampai tanda, didapatkan larutan dengan konsentrasi 0,1 %.

#### **Penentuan IC<sub>50</sub> ekstrak etanol bunga telang**

Sejumlah larutan stok ekstrak etanol bunga telang serta vitamin C dengan lima seri konsentrasi yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 µg/mL, ditempatkan dalam labu takar 5,0 mL. Sampel selanjutnya ditambah dengan 0,7 mL DPPH 0,4 mM dan ditambah etanol hingga

tanda. Campuran tersebut divorteks selama 30 detik dan diinkubasi selama 30 menit. Absorbansi sampel diukur terhadap blangko yang terdiri dari sejumlah larutan stok dalam etanol pada  $\lambda_{maks}$ . Selain itu, dibandingkan dengan kontrol Vitamin C dengan berbagai seri konsentrasi yaitu 1,25, 2,5, 5, 10, 20 µg/mL dan 0,7 mL DPPH 0,4 mM dalam etanol *p.a* hingga tanda. Kemudian dihitung % aktivitas antiradikal. Pembuatan kurva regresi linier antara konsentrasi melawan % aktivitas antiradikal sehingga didapatkan persamaan regresi linier untuk menentukan konsentrasi sampel pada aktivitas 50%. Uji aktivitas antiradikal direplikasi sebanyak tiga kali. Setiap sekali uji, pembuatan stok dan pengenceran sampel juga direplikasi sebanyak tiga kali.

#### **Analisis**

Penentuan aktivitas antiradikal dilakukan dengan perhitungan *inhibitory concentration* (IC<sub>50</sub>). Nilai IC<sub>50</sub> merupakan konsentrasi ekstrak dan vitamin C yang memberikan % aktivitas antiradikal sebesar 50% dibanding kontrol melalui suatu persamaan garis regresi linier antara kadar terhadap % penangkapan radikal (Widhihastuti, 2011).

$$\% \text{ aktivitas antiradikal} = \frac{(\text{abs. kontrol} - \text{abs. sampel})}{\text{abs. kontrol}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dimasukkan ke dalam persamaan regresi  $Y = bX+a$  dengan konsentrasi ekstrak (ppm) sebagai absis (sumbu X) dan nilai % inhibisi (antioksidan) sebagai ordinat (sumbu Y). Nilai IC<sub>50</sub> dari perhitungan pada saat % inhibisi sebesar 50%.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses ekstraksi simplisia bunga telang ini menggunakan teknik maserasi yang merupakan teknik penyarian zat aktif dengan perendaman menggunakan pelarut polar atau non polar selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Penggunaan etanol 70% teknis sebagai pelarut dalam ekstraksi pada penelitian ini dikarenakan etanol 70%

Tabel 1. Hasil Penentuan IC<sub>50</sub> Lima Ekstrak Herba dan Vitamin C

| Ekstrak      | nilai IC <sub>50</sub> ( $\mu$ g/mL) |       |       | Rata-rata ( $\mu$ g/mL) ±SD | Kategori antioksidan (Reynertson,2007) |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--|
|              | Rep 1                                | Rep 2 | Rep 3 |                             |  |
| Bunga telang | 40,01                                | 42,25 | 41,83 | 41,36 ± 1,191               | Sangat aktif                           |
| Vitamin C    | 5,78                                 | 6,44  | 6,543 | 6,25 ± 0,414                | Sangat aktif                           |

mempunyai daya penetrasi yang baik pada sisi hidrofil dan lipofil, sehingga dapat menembus membran sel, masuk ke dalam sel dan berinteraksi dengan metabolit di dalam sel. Etanol 70% juga mampu menyari senyawa-senyawa yang diperlukan untuk uji aktivitas bunga telang yaitu fenolik, flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan steroid (Saifudin, 2014).


Aktivitas antioksidan ekstrak etanol bunga telang secara kuantitatif ditentukan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), yaitu berdasarkan kemampuan ekstrak etanol bunga telang dalam mereduksi atau menangkap radikal DPPH. Kemampuan ekstrak etanol bunga telang dan pembanding vitamin C dapat dilihat dari berkurangnya intensitas warna ungu dari larutan DPPH yang telah ditambahkan dalam sampel dan pembanding. Berkurangnya intensitas warna larutan DPPH tersebut dapat menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara atom hidrogen yang dilepas oleh bahan uji dengan molekul radikal DPPH sehingga terbentuk senyawa 1,1-difenil-2-picrilhidrazin yang berwarna kuning. Semakin besar konsentrasi bahan uji, warna kuning yang dihasilkan akan semakin kuat (Molyneux, 2004).

Pengurangan intensitas warna ungu larutan DPPH ini secara kuantitatif dapat dihitung dari berkurangnya absorbansi larutan tersebut. Semakin besar konsentrasi bahan uji maka absorbansi yang terbaca semakin kecil, yang berarti aktivitas bahan uji dalam menangkap radikal DPPH semakin besar. Absorbansi yang terukur merupakan absorbansi sisa DPPH yang tidak bereaksi dengan larutan uji (Molyneux, 2004).

Uji aktivitas antiradikal dengan metode DPPH dilakukan pada panjang gelombang 517,6 nm dengan waktu inkubasi 30 menit. Penentuan aktivitas antiradikal dilakukan melalui perhitungan *inhibitory concentration* (IC<sub>50</sub>). Nilai IC<sub>50</sub> adalah konsentrasi ekstrak dan standar yang memberikan % aktivitas antiradikal sebesar 50% dibanding kontrol melalui suatu persamaan garis regresi linier antara kadar terhadap % penangkapan radikal (Mailandari, 2012). Semakin besar nilai IC<sub>50</sub>, semakin kecil aktivitas antioksidannya dan sebaliknya semakin kecil nilai IC<sub>50</sub>, semakin besar pula aktivitas antioksidannya.

Secara spesifik, suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai IC<sub>50</sub> kurang dari 50  $\mu$ g/ml, kuat untuk IC<sub>50</sub> bernilai 50-100  $\mu$ g/ml, sedang jika IC<sub>50</sub> bernilai 151-200  $\mu$ g/ml (Molyneux, 2004). Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan nilai IC<sub>50</sub> ekstrak bunga telang sebesar 41,36 ± 1,191  $\mu$ g/mL dan nilai IC<sub>50</sub> Vitamin C sebesar 6,25 ± 0,414  $\mu$ g/mL (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa sampel memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat sedangkan untuk vitamin C memberikan nilai IC<sub>50</sub> sebesar 6,25  $\mu$ g/ml yang termasuk dalam kategori sangat kuat.

Hasil penelitian ekstrak bunga telang memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat ini kemungkinan karena kandungan fenolik di dalamnya. Mekanisme antioksidan senyawa fenolik adalah berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana senyawa fenolik akan berperan sebagai agen pereduksi sehingga akan dapat mereduksi radikal bebas (reaktif) yang terbentuk menjadi spesies yang tidak reaktif lagi. Reaksi antara radikal DPPH dengan senyawa fenolik dalam bunga telang



Gambar 1. Reaksi Antara Radikal DPPH dengan Senyawa Fenolik dalam Bunga Telang

sebagai senyawa penangkap radikal dapat dilihat pada gambar 1.

Fenolik dalam ekstrak etanol bunga telang akan melepaskan H<sup>+</sup> yang merupakan salah satu radikal bebas. H<sup>+</sup> akan berikatan dengan radikal DPPH membentuk senyawa baru yaitu difenil pikrilhidrazin yang stabil. Senyawa fenolik yang terkandung dalam ekstrak etanol bunga telang sebagai penangkap radikal bebas yang kehilangan H<sup>+</sup> akan menjadi radikal baru yang relatif lebih stabil dan tidak berbahaya bagi tubuh karena adanya efek resonansi intiaromatik, sehingga radikal bebas tidak terbentuk dan dapat mencegah maupun memperbaiki kerusakan jaringan yang merupakan efek dari serangan radikal bebas. Senyawa fenolik memiliki bentuk gugus kimia heterogen yang mengandung gugus fenol (gugus hidroksil fungsional dalam 6 cincin aromatik) dalam struktur dasarnya. Selain itu, senyawa fenolik mampu meningkatkan aktivitas enzim antioksidan dan menginduksi sintesis protein antioksidan (Walter and Marchesan, 2011).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2019) yang menyebutkan ekstrak etanol bunga telang tidak poten sebagai antioksidan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perbedaan

ketinggian tempat tumbuh dan juga perbedaan konsentrasi etanol yang digunakan sebagai cairan penyari. Berdasarkan penelitian Sholekah (2017) menyebutkan bahwa kandungan fitokimia hasil dari metabolit sekunder seperti flavonoid dan beta karoten dari suatu tanaman akan berbeda pada setiap wilayah dipengaruhi oleh faktor lingkungan di antaranya cahaya, suhu, pH, ketinggian tempat, serta temperatur.<sup>32</sup>

Selain itu hal lain yang berpengaruh terhadap total flavonoid dan aktivitas antioksidan adalah konsentrasi etanol yang digunakan. Pada penelitian Anisa (2019), pelarut yang digunakan adalah etanol 96%, pada penelitian ini pelarut yang digunakan adalah etanol 70%. Penelitian Suhendra, dkk (2019) menyebutkan bahwa konsentrasi pelarut etanol berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen, total fenol, total flavonoid dan aktivitas penghambat radikal DPPH ekstrak, dengan kandungan tertinggi diperoleh pada etanol konsentrasi 70%.

## KESIMPULAN

Nilai IC<sub>50</sub> ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea* L) sebesar 41,36 ± 1,191 µg/mL, termasuk kategori sangat poten sebagai antioksidan.

## Daftar Pustaka

- Andriani, D. and Murtisiwi, L., 2018. Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) dengan Spektrofotometri UV Vis. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 2 (1): 32-38.

- Anisa, N., 2019. Potensi Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria Ternatea*) Sebagai Antioksidan dan Inhibitor Tirosinase, *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Apak, R., Gorinstein, S., Böhm, V., Schaich, K.M., Özyürek, M., and Güçlü, K., 2013. Methods of Measurement and Evaluation of Natural Antioxidant Capacity/ Activity (IUPAC Technical Report). *Pure and Applied Chemistry*, Vol. 85 (5): 957–998.
- Departemen Kesehatan RI. 2008. *Farmakope Herbal Indonesia Edisi I*. Jakarta, 174.
- Dutta, S. & Ray, S., 2014 Evaluation of Antioxidant Potentials of Leaf Aqueous and Methanolic Extracts of *Calophyllum inophyllum* in Relation to Total Phenol and Flavonoid Contents. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*, 5(3), 441-450.
- Gupta, G.K., Jagbir, C., and Manisha, B., 2010. *Clitoria ternatea* (L.): Old and new aspects. *Journal of Pharmacy Research*, 3(11), 2610-2614.
- Kazuma, K., Noda, K., and Suzuki, M., 2013. Flavonoid composition related to petal color in different lines of *Clitoria ternatea*. *Phytochemistry*, 64 (1133-1139).
- Kogawa K, Kazuma K, Kato N, Noda N and Suzuki M., 2006. Biosynthesis of malonylated flavonoid glycosides on the basis of malonyltransferase activity in the petals of *Clitoria ternatea*. *Journal of Plant Physiology*, 2(6), 374-379.
- Mailandari, M., 2012. Uji aktivitas antioksidan ekstrak daun *Garcinia kydia roxb.* dengan metode DPPH dan identifikasi senyawa kimia fraksi yang aktif. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Molyneux, P., 2004. The use of the stable free radical diphenyl picrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. *Journal Science of Technology*, 26 (2): 211-219.
- Phaniendra, A., and Jestadi, D.B., 2015. Free Radicals : Properties , Sources , Targets , and Their Implication in Various Diseases. *Indian Journal of Clinical Biochemistry*, Vol. 30 (1): 11–26
- Purba, E.C., 2020. Kembang Telang (*Clitoria ternatea* L.): Pemanfaatan dan Bioaktivitas . *EduMatSains*, 4 (2), 111-124
- Saifudin, A., 2014. *Senyawa Alam Metabolit Sekunder: Teori, Konsep, dan Teknik Pemurnian*. Yogyakarta: Depublish Publisher.
- Sholekah, F., 2017. Perbedaan Ketinggian Tempat Terhadap Kandungan Flavonoid Dan Beta Karoten Buah Karika (*Carica Pubescens*) Daerah Dieng Wonosobo. *Prosiding*, Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Biologi.
- Suhendra, C.P., Widarta, I.W.R., and Wiadnyani, A.A.I.S., 2019. Pengaruh Konsentrasi Etanol Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rimpang Ilalang (*Imperata Cylindrica* (L) Beauv.) Pada Ekstraksi Menggunakan Gelombang Ultrasonik. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*, Vol. 8, No.1, 27-35.
- Susantiningih, T., 2015. Obesitas dan Stres Oksidatif. *Jurnal Kedokteran Unila*, Vol 5, No.9
- Terahara, N., Toki, K., Saito, N., Honda, T., Matsui, T., and Osajima, Y., 1998. Eight new anthocyanins, ternatins C1-C5 and D3 and preternatins A3 and C4 from young *Clitoria ternatea* flowers. *J Nat Prod*, 61(11), 1361-1367.
- Walter, M., and Marchesan, E.. 2011. Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Rice . *Brazilian Archives of Biology and Technology*, Vol. 54 (2): 371–77.

Werdhasari, A., 2014. Peran Antioksidan Bagi Kesehatan. *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 59-68

Widhihastuti, E., 2011. Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH serta Korelasinya dengan Kadar Fenolik Pada Lima Jenis Herba Bahan Obat Alam Indonesia. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

# Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Bunga Telang (Clitoria ternatea L) dari Daerah Sleman dengan Metode DPPH

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II<br>Student Paper   | 1 % |
| 2 | <a href="http://ejurnal.esaunggul.ac.id">ejurnal.esaunggul.ac.id</a><br>Internet Source   | 1 % |
| 3 | <a href="http://www.nutrisiajournal.com">www.nutrisiajournal.com</a><br>Internet Source   | 1 % |
| 4 | <a href="http://jurnalnasional.ump.ac.id">jurnalnasional.ump.ac.id</a><br>Internet Source   | 1 % |
| 5 | Kogawa, K.. "Biosynthesis of malonylated flavonoid glycosides on the basis of malonyltransferase activity in the petals of Clitoria ternatea", Journal of Plant Physiology, 20070726<br>Publication | 1 % |
| 6 | <a href="http://arteri.sinergis.org">arteri.sinergis.org</a><br>Internet Source   | 1 % |
| 7 | <a href="http://ejurnal.unib.ac.id">ejurnal.unib.ac.id</a><br>Internet Source   | 1 % |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 8  | jurnal.poliupg.ac.id<br>Internet Source   | 1 %  |
| 9  | karyatulisilmiah.com<br>Internet Source   | 1 %  |
| 10 | repository.unisba.ac.id:8080<br>Internet Source   | 1 %  |
| 11 | seminar.uad.ac.id<br>Internet Source  | 1 %  |
| 12 | Agung Wahyudi, Yenni Bahar, Paramita Septianawati. "PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN KEMANGI ( <i>Ocimum basilicum L folium</i> ) TERHADAP KADAR SGOT DAN SGPT TIKUS PUTIH ( <i>Rattus norvegicus strain wistar</i> ) YANG DIINDUKSI MSG", Herb-Medicine Journal, 2018<br>Publication | <1 % |
| 13 | hendratanoto.wordpress.com<br>Internet Source   | <1 % |
| 14 | mymemory.translated.net<br>Internet Source  | <1 % |
| 15 | www.acikerisim.aku.edu.tr:8080<br>Internet Source   | <1 % |
| 16 | journal.sgu.ac.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 17 | lib.ui.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 18 | repositorio.uchile.cl<br>Internet Source   | <1 % |
| 19 | www.perpusffup.or.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 20 | jurnalbiologi.fmipa.unila.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 21 | Ahmad Fadhil Muzaki, Wilis Ari Setyati, Subagiyo Subagiyo, Rini Pramesti. "AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RUMPUT LAUT Halimeda macroloba DARI PANTAI TELUK AWUR, JEPARA, JAWA TENGAH", JURNAL ENGGANO, 2018<br>Publication                  | <1 % |
| 22 | Siti Susanti, Valentinus Priyo Bintoro, Antonius Hintono, Neti Zuniati, Fahmi Arifan. "Optimasi Substitusi Saus Tomat dengan Ekstrak Buah Semu Jambu Monyet pada Formulasi Bumbu Marinasi Steak", JURNAL ILMIAH SAINS, 2020<br>Publication | <1 % |
| 23 | journal.fmipaukit.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 24 | journal.uii.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 25 | jurnal.unitri.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
|    | res.mdpi.com   |      |

- Internet Source **26** <1 %
- 
- Internet Source **27** smart-pustaka.blogspot.com <1 %
- 
- Internet Source **28** smartaccounting.files.wordpress.com <1 %
- 
- Internet Source **29** www.hipwee.com <1 %
- 
- Internet Source **30** www.sciencegate.app <1 %
- 
- Internet Source **31** zbook.org <1 %
- 
- 32** Bambang Kunarto, Putri Arum Wijayanti, Ery Pratiwi, Rohadi Rohadi. "TOTAL FENOLIK, FLAVONOID, ANTOSIANIN. DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN OLEORESIN FULI PALA (*Myristica Fragrans Houtt*) YANG DIEKSTRAK MENGGUNAKAN METODE SOLID LIQUID MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION", Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, 2018 Publication <1 %
- 
- 33** Fensia Analda Souhoka, Nikmans Hattu, Marsye Huliselan. "Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Biji Kesumba Keling (*Bixa orellana L*)", Indo. J. Chem. Res., 2019 Publication <1 %
-

|    |   |      |
|----|---|------|
| 34 | afilia.blogspot.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 35 | cuvillier.de<br>Internet Source   | <1 % |
| 36 | jurnal.akfar-alfatah.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 37 | spiritforlifenow.blogspot.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 38 | www.kafekepo.com<br>Internet Source   | <1 % |
| 39 | www.reportworld.co.kr<br>Internet Source  | <1 % |
| 40 | www.semanticscholar.org<br>Internet Source  | <1 % |
| 41 | Fitri Ani, Nurdianti Awaliyah. "PENGARUH SUHU EKSTRAKSI DAN LAMA PEMANASAN TERHADAP STABILITAS PIGMEN ANTOSIANIN DAN KARATENOID", Jurnal Buletin Al-Ribaath, 2015<br>Publication              | <1 % |
| 42 | Erni Rustiani, Dwi Indriati, Linda Actia. "FORMULASI TABLET HISAP CAMPURAN KATEKIN GAMBIR DAN JAHE DENGAN JENIS PENGIKAT PVP DAN GOM ARAB", Jurnal Fitofarmaka Indonesia, 2019<br>Publication | <1 % |

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography    On

Exclude matches      Off